



Frecuencia de *Neisseria gonorrhoeae* en mujeres universitarias y factores de riesgo para la diseminación de microorganismos.

Alejandra Vásquez Hernández¹, Jenniffer Puerta Suárez¹

¹ Grupo Reproducción, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Autor de correspondencia: alejandra.vasquezh5@gmail.com

INTRODUCCIÓN




OBJETIVO

Evaluar la prevalencia de *Neisseria gonorrhoeae* en muestras de flujo vaginal y cavidad oral de mujeres universitarias e identificar factores de riesgo para la diseminación de esta infección.




Bibliografía

1. Badillo-Viloria M, Mendoza-Sánchez X, Vásquez MB, Díaz-Pérez A. Comportamientos sexuales riesgosos y factores asociados entre estudiantes universitarios en Barranquilla, Colombia, 2019. Enfermería Global. 2020;19(3):422-49.
2. Spindola T, Araújo ASdBd, Brochado EdJ, Marinho DFS, Martins ERC, Pereira TdS. Prácticas sexuales y comportamiento de jóvenes universitarios frente a la prevención de infecciones de transmisión sexual. Enfermería Global. 2020;19(58):109-40.
3. Martín-Sánchez M, Fairley CK, Ong JJ, Maddaford K, Chen MY, Williamson DA, Bradshaw CS, Chow EPF. Clinical presentation of asymptomatic and symptomatic women who tested positive for genital gonorrhoea at a sexual health service in Melbourne, Australia. Epidemiol Infect. 2020;148

MÉTODOS



RESULTADOS Y DISCUSIÓN



CONCLUSIONES

Las universitarias presentan conductas sexuales de riesgo que favorecen la diseminación de ITS. Es frecuente la detección de *N. gonorrhoeae* en muestras de flujo vaginal y cavidad oral de mujeres asintomáticas, lo que destaca la necesidad de implementar estrategias integrales para iniciar la búsqueda activa de ITS en población de riesgo asintomática, al igual que estrategias educativas para generar conciencia en la población universitaria.